

Isomerieerscheinungen bei sekundären Hydrazonen von Ketonen, insbesondere Phenacylaminen.

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde
einer Hohen Naturwissenschaftlichen Fakultät
der Friedrich-Alexanders-Universität zu Erlangen

vorgelegt von
Wilhelm Brecht
aus Regensburg.

Tag der mündlichen Prüfung: 24. Oktober 1936.

Buchdruckerei Robert Windsheimer, Erlangen-Bruck.
1937

1937/61

Referent: Geheimrat Prof. Dr. M. Busch

Dekan: Prof. Dr. J. Schwemmle




Meinen lieben Eltern in Dankbarkeit gewidmet

Inhaltsverzeichnis.



	Seite
I. Theoretischer Teil	5
II. Praktischer Teil	20
A. Versuche zur Darstellung primärer Phenacyl-p-toluidinhydrazone mit:	
1. 3-Pyridylhydrazin	20
2. p-Nitrophenylhydrazin	22
3. 2,4-Dinitrophenylhydrazin	23
B. Versuche zur Darstellung sekundärer Phenacyl-p-toluidinhydrazone mit:	
1. N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin	24
2. N-Benzyl-p-nitrophenylhydrazin	29
3. N-Methyl-m-nitrophenylhydrazin	31
4. N-Methyl-p-hydrazinobenzoesäure	33
5. N-Methyl-p-hydrazinobenzoesäureäthylester	35
6. p-Nitrobenzyl-phenylhydrazin	36
7. p-Bromphenyl-N-Methylhydrazin	37
8. N-Methyl-p-hydrazinosulfoäure	38
9. N-Methyl-p-Cyanphenylhydrazin	39
10. Kondensationsversuche des N-Methyl-p-nitrophenylhydrazins mit anderen Ketonen:	
a) m-Nitroacetophenon	42
b) Desoxybenzoin	43
c) Benzoin	44
d) Anilidobenzoin	45
e) m-Nitrophenacyl-p-toluidin	47

Theoretischer Teil.

Im Jahre 1924 konnten M. Busch und Mitarbeiter¹⁾ isomere Hydrazone der Phenacylamine darstellen, nachdem dies früher vergeblich versucht worden war²⁾. Nahm man für die eine der beiden Formen die Hydrazonkonfiguration




an, so standen hinsichtlich der Struktur der Isomeren folgende drei theoretisch mögliche Formen offen:



Formel II würde dem Stereoisomeren im Sinne der Hantzsch-Werner'schen Theorie entsprechen. Doch waren auch die Strukturbilder III und IV in Betracht zu ziehen, da einerseits häufig ein Wandern eines Methylenwasserstoffs zu beobachten ist und andererseits Hydrazone durch Kuppelung einer Methylengruppe mit Diazoniumsalzen entstehen können. Das verschiedene Verhalten der beiden isomeren Hydrazone gegenüber Aldehyden führte zur Klärung der Verhältnisse.


Die höher schmelzende Form reagiert glatt mit Aldehyden unter Wasserabspaltung, wobei ein Triazinderivat resultiert:



1) Busch, Friedenberger, Tischbein B 57, II, 1783.


2) Busch, Hefele, J. pr. Ch. 83, 425.

Die niedrigschmelzende Form dagegen liefert ein aldol-ähnliches Anlagerungsprodukt:




das sich leicht wieder in seine Bestandteile aufspalten läßt. Somit war eine Desmotropie im Sinne I, III nicht möglich, da hier für beide Formen die gleiche Kondensationsfähigkeit zu Triazinderivaten hätte beobachtet werden müssen. Bei dem Fall I, IV hätte das aldolähnliche Kondensationsprodukt nicht auftreten können, zudem mußte ein Azoprodukt wie IV für nascierenden Wasserstoff empfänglich sein. Da aber keines der Isomeren sich hydrieren ließ, so blieb schließlich nur Stereoisomerie im Sinne I, II übrig. Ganz abgesehen von den oben angeführten Reaktionen, die für eine Entscheidung im Sinne der Hantzsch-Werner'schen Theorie maßgebend sind, ist die Stabilität der beiden Isomeren so groß, daß Desmotropie schon aus diesem Grunde nicht in Frage kommen kann.

Seine endgültige Bestätigung fand dieser Beweis, als es im Jahre 1931 ¹⁾ gelang, sekundäre isomere Hydrazone der Phenacylaminreihe herzustellen. Beide Formen waren mit Aldehyden nicht mehr in Reaktion zu bringen. Eine Verbindung vom Typus:



hätte aber mit Aldehyden unter Bildung eines Glyoxalinringes reagieren müssen:



oder unter Addition des Aldehyds (siehe oben).

1) Bußch, Küspert, Wesely B 64, 1589.

Somit dürfte auch bei den sekundären Hydrazonen kein Zweifel an ihrer Hydrazonnatur bestehen.

Bei den Versuchen, sekundäre Hydrazone von Phenacylaminen zu gewinnen, wurde nun die interessante Beobachtung gemacht, daß außer den beiden Isomeren noch eine dritte Form auftrat. Alle drei Formen unterschieden sich im Bezug auf Farbe, Löslichkeit, Kristallform und Schmelzpunkt von einander. Zwei davon waren die normalen Isomeren [n- und h-Form], während die dritte Form eine bimolekulare Verbindung darstellte, aus je einem Molekül der Stereoisomeren, also racematahnlich, aufgebaut. Aus der alkoholischen Reaktionsflüssigkeit kristallisierte letztere oft neben den Isomeren aus und konnte unbeschadet aus den gewöhnlichen Lösungsmitteln [Alkohol, Äther, Benzol, Petroläther] umkristallisiert werden. Löste man sie jedoch in Chloroform und gab Alkohol zu, so zerfiel sie bei langsamem Verdunsten des Chloroforms in ihre beiden Komponenten; die beiden — monomolekularen — Stereoisomeren kristallisierten infolge ihrer verschiedenen Löslichkeit nacheinander aus. Die Ursache der spaltenden Wirkung des Chloroform-Alkohol-Gemisches ist darin zu erblicken, daß die Löslichkeit der Isomeren in diesem Solvens einen merklichen Unterschied aufweist. Ebenso leicht wie die Zerlegung des Racemats gelang auch dessen Aufbau. Löste man gleiche Gewichtsteile der Antipoden in Benzol und gab dann Petroläther bis zur Trübung zu, so fiel das Racemat an. Obgleich eine optische Aktivität der n- und h-Form nicht besteht, liegt doch eine auffallende Ähnlichkeit mit Racematen optisch aktiver Verbindungen vor, zumal auch darin, daß diese bimolekularen Hydrazone in Lösung nur monomolekular vorhanden.

Die schöne und schnelle Methode¹⁾ zum Nachweis der Racemisierungsfähigkeit von Isomeren wurde von E. Schmidt²⁾ angewandt. Sie besteht darin, daß man die n- und h-Form im Gewichtsverhältnis 9:1, 8:2, 7:3 usw. mischt und die entsprechenden Schmelzpunkte feststellt. Auf


1) Freudenberg, Stereochemie, S. 558.

2) E. Schmidt, Dissertation Erlangen 1934.

diese Weise gelangt man zu einem Schmelzpunktsdiagramm, das bei Eintritt von Racemisierung bei dem Mischungsverhältnis 5:5 ein deutliches Maximum aufweist, während zwischen diesem und den reinen Schmelzpunkten zwei Eutektika auftreten. Das Racemat schmilzt dabei höher als die reinen Komponenten [Fig. A], doch muß auch mit der Möglichkeit eines niedrigeren Schmelzpunktes gerechnet werden [Figur B], wie er bei Racematen optisch aktiver Verbindungen vielfach beobachtet wurde¹⁾. Ausschlaggebend für die Möglichkeit der Racemisierung ist aber immer ein Maximum im Schmelzpunktsdiagramm beim Mischungsverhältnis 1:1.

An Hand der zahlreichen Versuche, die zur Herstellung sekundärer Hydrazone der Phenacylaminreihe gemacht wurden, ist eindeutig die geringe Bildungstendenz festzustellen. Mehrstündiges Erhitzen auf dem Wasserbad, Zusammenschmelzen der Komponenten, auch das geschlossene Rohr wurden zur Erzwingung der Reaktion benützt. Diese Bedingungen sind nun sowohl für das empfindliche Phenacylamin, wie für die Gewinnung isomerer Hydrazone sehr ungünstig. Es mußten also vor allem die Bedingungen gefunden werden, die die Kondensationsfähigkeit heben; zu dem Zwecke studierte ich den Einfluß elektropositiver und elektronegativer Substituenten im Benzolkern des Hydrazins. Als Keton verwendete ich in fast allen Fällen das Phenacyl-p-toluidin.

Zunächst wurden Versuche mit dem primären 3-Pyridylhydrazin unternommen.



Seine Darstellung erfolgte nach einer Veröffentlichung von Binz²⁾. Seine Verwendung erschien allerdings schon von Anfang an als nicht gerade aussichtsreich. Wie aus der

1) Freudenberg „Stereochemie“ S. 559.

2) B. 68. I, 320.

Fig. A





Fig. B.




Literatur ersichtlich, hatte Binz¹⁾ bereits Kondensationsversuche mit Acetophenon, Propionaldehyd und Brenztraubensäure gemacht und dabei erst nach stundenlangem Erhitzen die Bildung der entsprechenden Hydrazone erzielen können. Isomere wurden in keinem der drei Fälle aufgefunden. Meine Bemühungen mit Phenacyl-p-toluidin verliefen samt und sonders negativ, obwohl die Reaktionsbedingungen weitgehend variiert wurden. Als Endprodukt resultierte in allen Fällen ein dunkelrotes Öl, das allen Versuchen, es kristallisiert zu erhalten, trotzte. Die Bildung dieser Öle wurde schon früher beobachtet²⁾ und ist auf eine Nebenreaktion des Ketons zurückzuführen. Sie vollzieht sich besonders leicht in saurer Lösung und da ihre Geschwindigkeit oft weitaus größer ist als die Hydrazonbildung, wird das Arbeiten mit Phenacylaminen erheblich erschwert. Daß die Bildung dieser Öle mit dem Iminwasserstoff in Zusammenhang zu bringen ist, konnte O. Küspert³⁾ nachweisen. Durch den Ersatz des Iminwasserstoffs z. B. durch die Acetylgruppe konnte nämlich die Stabilität des Ketons wesentlich erhöht werden. Über die Bildungsweise dieser lästigen Nebenprodukte gibt eine noch nicht veröffentlichte Arbeit aus dem hiesigen Institut von Fritz Povenz Aufschluß. Darnach wirkt Eisessig von einer bestimmten Konzentration ab spaltend auf das Keton. Die Spaltung erfolgt wahrscheinlich an der $\text{CH}_2\text{-NHR}$ -Bindung und verläuft über faßbare Zwischenprodukte. Als Endprodukt resultiert dann das jeweils angewandte Amin und Benzoesäure. Das Auftreten der Benzoesäure wurde auch von E. Schmidt [loc. cit.] schon beobachtet. Je nach dem Grad der Säurekonzentration gelingt es, ein kristallisiertes Zwischenprodukt zu isolieren. In meinem Fall waren es schöne gelbe Nadeln $F=167^\circ$. Vermutlich kommt es zur Bildung eines Pyridazinderivates.


1) A 486, 103.

2) Vergl. Dissert. Schmidt, Erlangen, 1934.

3) Dissertation Erlangen 1929.



Über die Spaltung des roten Oles gibt Pövenz folgende Möglichkeit an:



Der Versuch das sekundäre asymmetrische Benzyl-m-Pyridylhydrazin durch Einwirkung von einem Mol Benzylchlorid auf 2 Mole m-Pyridylhydrazin herzustellen 1), scheiterte ebenfalls an der Reaktionsträgheit des Hydrazins. Nach meinen Erfahrungen wäre allerdings bei den erfolglosen Arbeiten mit den primären m-Pyridylhydrazin die Verwendung von sekundärem noch aussichtsloser gewesen.

Weit besser im Hinblick auf die Kondensationsfähigkeit erwiesen sich p-Nitrophenylhydrazin und 2,4-Dinitrophenylhydrazin:

1) Vergl. M. Busch und Karl Lang, Journ. f. pr. Ch. 144, 291.



Im ersteren Falle war bereits nach zweistündigem gelinden Erwärmen (40—50°) auf dem Wasserbad die Reaktion beendet, während beim Dinitrophenylhydrazin das Zusammenschmelzen der Komponenten zum Ziele führte. In beiden Fällen konnten jeweils die beiden Isomeren in guter Ausbeute isoliert werden:

p-Nitrophenylhydrazon des Phenacyl-p-toluidins:

h-Form : F = 273°

n-Form : F = 153°

2,4 Dinitrophenylhydrazon des Phenacyl-p-toluidins:

h-Form : F = 203°

n-Form : F = 187°

In beiden Fällen wurde Racematbildung nicht beobachtet¹⁾.


Nachdem die Verwendung von negativen Gruppen als Substituenten als erfolgreich angesehen werden konnte, wandte ich mich im Laufe meiner Arbeiten zunächst den sekundären asymmetrischen Nitrohydrazinen zu. Das N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin war bereits bekannt und nach Ciufa und Rastelli²⁾ durch Methylieren des Kaliumsalzes des Nitrophenylhydrazins dargestellt worden. Das Verfahren erwies sich aber als umständlich und zudem die Ausbeute (die Verfasser machen darüber keine Angaben) durchaus unbefriedigend. Deshalb suchte ich nach einem anderen Weg, der mir das gewünschte Material in kürzerer Zeit und in genügender Ausbeute lieferte. Dabei ging ich vom p-Nitranilin aus, das ich durch methylieren und nitrosieren in das Nitroso-p-nitromethylanilin überführte³⁾. Es handelte sich nun darum, die Reduktion des Nitrosamins so zu leiten, daß nur die Nitrosogruppe, nicht aber die Nitrogruppe angegriffen wurde. Wie im praktischen Teil näher ausgeführt, gelang diese partielle Reduktion mit Schwefelwasserstoff.

1) Im Einklang mit den bisherigen Beobachtungen bei primären Hydrazonen.

2) Gaz. chim. ital. 52, II, 127.

3) Ullmann, An. 327, 113.

Reaktionsverlauf:



Das auf diese Weise dargestellte p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazin erwies sich mit dem von den italienischen Autoren beschriebenen Produkt identisch.


Die Kondensation des N-Methyl-p-Nitrophenylhydrazins mit Phenacyl-p-toluidin vollzog sich in Chloroformlösung ohne Zugabe eines Katalysators bereits in der Kälte. Nach 24stündigem Stehen im verschlossenen Kolben konnte ich zwei Formen isolieren:

h-Form: $F = 139^\circ$

n-Form: $F = 115-116^\circ$,

wobei die h-Form nur in ganz geringer Menge erhalten werden konnte. In Benzol-Petroläther-Lösung lagerten sich die beiden Isomeren zum Racemat zusammen: $F = 152^\circ$. Beim Zusammenschmelzen des Hydrazins mit dem Keton fielen alle drei Formeln an, die h-Form wieder in ganz geringer Menge. Auch die Zerlegung des Racemates gelang mittels Chloroform-Alkohol.

Weniger günstig gestaltete sich die Anwendung des N-Benzyl-p-nitrophenylhydrazins:




Seine Darstellung erfolgte analog den obigen Angaben und das erhaltene Hydrazin stimmte mit dem von Ciusa und Rastelli¹⁾ überein. Die Versuche in der Kälte zu kondensieren scheiterten, auch nach Zugabe von einigen Tropfen Eisessig oder alkoholischer Salzsäure. Erst ein

1) Gaz. chim. ital. 54, 72-78.

zweistündiges Erwärmen auf dem Wasserbad führte zu dem gewünschten Erfolg. Leider erhielt ich hier stets nur eine Form $[F = 136^{\circ}]$.

Versuche mit m-Nitrophenyl-N-methylhydrazin



blieben vollkommen erfolglos. Das noch unbekannte Hydrazin wurde ebenfalls auf dem Wege über das Nitrosamin erhalten und in Form von gelbbraunen Nadeln $[F = 70-72^{\circ}]$ isoliert. Nach dreistündigem Erhitzen der Chloroformlösung auf etwa 70° erhielt ich neben etwas Öl die Komponenten wieder zurück, während bei dem Versuch des Zusammenschmelzens lebhaftere Zersetzung eintrat und nach Aufarbeitung neben etwas unverändertem Keton dessen Umlagerungsform $[F = 164^{\circ}]$ und ein nicht kristallisierbares Öl als Zersetzungsprodukt anfiel. Auch der Versuch im geschlossenen Rohr in der Wasserbadkanone zum Ziele zu gelangen brachte keinen Erfolg.

Als weiteres Hydrazin brachte ich nun das asymmetrische p-Nitrobenzyl-phenylhydrazin:



in Anwendung, das bereits von E. Schmidt [loc. cit.] zur Kondensation benutzt wurde. Dieser erhielt bei Verwendung von Benzoin, Anisylphenylketon und p-Bromacetophenon stets gelbrote Öle, die sich nicht weiter verarbeiten ließen. Auch ich erhielt bei Benützung von Phenacyl-p-toluidin nach dreistündigem Erwärmen auf dem Wasserbad $[70^{\circ}]$ ein dunkelrotes Öl, welches aber nach vielen Bemühungen doch kristallin erhalten werden konnte. Allerdings war auch in diesem Falle nur eine Form erhältlich, die sich durch Chloroform-Alkohol nicht zerlegen ließ. Derbe rotbraune Druſen $F = 137,5^{\circ}$.

Nachdem sich die Einführung einer para-ständigen Nitrogruppe in den Kern des Phenylhydrazins für die Kondensationsfähigkeit als günstig erwiesen hatte, verfolgte ich den Einfluß anderer negativer Substituenten. Zunächst prüfte ich die Wirkung der Carboxylgruppe unter Verwendung der p-Methylhydrazino-benzoesäure




Sie ist in der Literatur noch nicht beschrieben und wurde von mir nach folgender Methode dargestellt. Methylierung von p-Aminobenzoesäureester nach Houben-Schottmüller¹⁾, Trennung des Monomethylproduktes vom Dimethylprodukt durch Nitrosierung und Reduktion des Nitrosamins nach Emil Fischer. Nach Zugabe konzentrierter Natronlauge erfolgte Verseifung des Esters [Praktischer Teil]. Auf diese Weise erhielt ich das Carbonsäurehydrazin in sternchenförmig gruppierten, farblosen Kryställchen, die nach mehrmaligem Umkrystallisieren aus Äthylalkohol bei 223—225° unter lebhafter Zersetzung schmolzen. Die Ausbeute war gering.

Während das Carbonsäurehydrazin mit Phenacyl-p-toluidin in der Kälte auch bei Zugabe von Kondensationsmitteln [Eisessig, alkoholische Salzäure] nicht reagierte, konnte nach zweieinhalbstündigem Erwärmen auf dem Wasserbad neben dem größten Teil der Ausgangsmaterialien und den bekannten lästigen Ölen nur ein Produkt erhalten werden, das aus farblosen Kryställchen bestand: $F = 187^\circ$. Leider ergab sich aber bei der Stickstoffanalyse ein um 0,9% zu hoher Stickstoffgehalt, der sich auch nach mehrmaligem Umkrystallisieren nicht änderte. Wodurch dieser Mißstand bedingt war, konnte ich nicht feststellen. Die Befürchtung, daß dem Hydrazon noch unveränderte p-Methyl-Hydrazinobenzoesäure beigemischt sei, erwies sich als überflüssig, da die angestellten Reduktionsversuche mit ammoniakalischer Silberlösung und mit Fehlingscher


1) B. 42, 3739—3740.

Lösung negativ verliefen, d. h. gegen eine Beimischung von Hydrazin sprachen. Die Ausbeute an Kondensationsprodukt (15 %) war sehr gering. Dreistündiges Erhitzen in der Wasserbadkanone im Einschlußrohr führten zu keinem Erfolg, da hier wieder Öl als Zerfallsprodukt des Ketons anfiel, aus dem durch Verreiben mit Äther etwas Hydrazin zurückgewonnen werden konnte.


Ebenso unbefriedigend wie die oben angeführten Kondensation verlief die mit dem bisher noch nicht bekannten N-Methyl-hydrazino-p-benzoesäureäthylester:



Es gelang mir lediglich einige Milligramm gelber feiner Nadelchen zu isolieren, die zwischen 201 und 204° unter lebhafter Zersetzung schmolzen. Eine Analyse war wegen der minimalen Menge des Materials nicht möglich. Zudem deuteten die Zersetzungsercheinungen und der hohe Schmelzpunkt nicht auf das Vorhandensein eines Hydrazons hin. Es wäre eher anzunehmen, daß hier zwei Moleküle des N-Methylhydrazino-carbonsäureesters nach Art der Hydrazidbildung untereinander reagiert hätten:



Als nächsten Substituenten führte ich Brom in das Molekül ein. Auch das N-Methyl-Bromphenylhydrazin



war in der Literatur nicht beschrieben und wurde über das


N-Methyl-p-Bromanilin¹⁾ nach dem bisher beschriebenen Schema als dunkelrotes Öl gewonnen. Ein dreistündiges Erhitzen der Chloroformlösung des Bromhydrazins mit Phenacyl-p-toluidin hatte keinerlei Erfolg, ebenso führte ein 24 stündiges Stehen im verschlossenem Kolben nicht zum Ziel. Erst nach Zugabe von einigen Tropfen alkoholischer Salzsäure konnte ich das N-Methyl-p-Bromphenylhydrazon des Phenacyl-p-toluidins in Form von orangegelben Nadelchen (F = 158°) in guter Ausbeute neben etwas Öl (unverändertes Hydrazin) und Keton erhalten. Doch mußte ich auch hier mit nur einer Form vorlieb nehmen.

Versuche mit N-Methyl-Hydrazino-phenylsulfosäure



zeitigten ebenfalls nur eine einzige Form: Gelbbraune Nadeln F = 131,5°. Die Darstellung des Hydrazins erfolgte nach der Vorschrift von Pfülf²⁾. Die Reaktion verlief äußerst langsam, wobei noch als erschwerender Umstand hinzu kam, daß die Hydrazinosulfosäure in den gebräuchlichen Lösungsmitteln wie Chloroform, Alkohol, Benzol und Dioxan sehr schwer löslich war. So mußte mit einer Suspension des Hydrazins gearbeitet werden. Das lange Erwärmen (bis zu 7 Stunden) auf dem Wasserbad konnte nach den bisherigen Erfahrungen dem Phenacyl-p-toluidin nicht zuträglich sein, weshalb auch große Mengen eines Zerfallsproduktes auftraten.

Wesentlich günstiger im Bezug auf Kondensationsfähigkeit erwies sich das N-Methyl-p-Hydrazinobenzinotril




Daselbe war noch nicht bekannt und wurde von mir aus

1) A. 338, 125.

2) A. 239, 219.

aus dem p-Aminobenzonitril erhalten. Das salzsaure Salz ($F = 187^{\circ}$; Zersetzung) konnte mit dem Phenacyl-p-toluidin bereits in der Kälte in Reaktion gebracht werden, wobei sich schon nach kurzem Stehen feine ockergelbe Nadelchen ($F = 226,5^{\circ}$) aus der Reaktionsflüssigkeit ausschieden. Eine zweite Form konnte nicht isoliert werden, ebenso war eine Zerlegung des Hydrazons nicht möglich.

Leider waren meine Versuche, das N-Methyl-p-rhodanphenylhydrazin



darzustellen nicht von Erfolg begleitet. Nach der Reduktion des Nitrosamins konnte ich in der ätherischen Lösung das Hydrazin jedesmal kurze Zeit mittels ammoniakalischer Silberjallösung nachweisen. Nach einhalbstündigem Stehen blieben jedoch die Reduktionsercheinungen bereits aus und nach vorsichtigem Abdampfen des Äthers resultierte ein schwarzes schmieriges Produkt, das trotz vieler Versuche nicht in reiner, kristallisierter Form erhalten werden konnte. Allem Anschein nach hatte man es hier mit einem äußerst luftempfindlichen Körper zu tun. So mußten weitere Versuche mit diesem Hydrazin als aussichtslos aufgegeben werden.

Die angeführten Untersuchungen zeigen, daß für Kondensationen wie für die Gewinnung isomerer Hydrazone die Aussichten bei Verwendung von N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin am günstigsten sind. Aus diesen Gründen wandte ich mich zum Schluß meiner Arbeiten wieder diesem Hydrazin zu und kondensierte es der Reihe nach mit m-Nitroacetophenon, Desoxybenzoin, Benzoin, Anilidobenzoin und m-Nitrophenacyl-p-toluidin. Wie aus dem praktischen Teil näher ersichtlich, erfolgten die Kondensationen bei Zugabe von Kondensationsmitteln teils bereits in der Kälte, teils nach mäßigem Erwärmen auf dem Wasserbad. Beim Anilidobenzoin konnte ich zwei Isomere isolieren, die sich im Gegensatz zu den bisher

erhaltenen Hydrazonen dieser Reihe beim Schmelzen zer-
setzten:

h-Form: $F = 139,5^0$

n-Form: $F = 120^0$.

Das Zeretzungsprodukt krytallisierte aus Alkohol in feinen gelbbraunen Nadeln und wies einen Schmelzpunkt bei 100^0 auf. Der Stickstoffgehalt betrug 9,7%. Bei der Zeretzung war Geruch nach nitrosen Gasen zu bemerken. Eine Molekulargewichtsbestimmung nach Raft ergab für den Körper ein Molekulargewicht von 114,6 gegenüber dem Molekulargewicht des Hydrazons von 436. Es mußte also eine tiefgründige Veränderung des Hydrazons eingetreten sein. Von einer genauen Untersuchung des Zeretzungsvorganges wurde im Rahmen dieser Arbeit abge-
sehen.

Auch die Anwendung von m-Nitrophenacyl-p-
toluidin ergab zwei Formen:

h-Form: $F = 166^0$

n-Form: $F = 148^0$.

Die Bemühungen die entsprechenden Racemate zu erhalten
scheiterten in beiden Fällen.

Gesamtergebnis.

Aus den angeführten Versuchsmaterial kann nunmehr
zusammenfassend gefolgert werden:

1. Die Einführung negativer Substituenten in das Mole-
kül des Hydrazins ist für die Kondensationsfähigkeit mit
Ketonen günstig. Eine Ausnahme machen hierbei die
Carbonsäure- und Carbonsäureestergruppe. Die Verwen-
dung der Sulfogruppe mußte wegen der ungünstigen Lö-
sungsverhältnisse ebenfalls ausscheiden. Am besten hat sich
die Nitrogruppe erwiesen, die sich in Parastellung befindet.
Im Hinblick auf die Gewinnung von Isomeren ist das sekun-
däre asymmetrische p-Nitrophenyl-N-Methyl-Hydrazin den
übrigen vorzuziehen, da bei anderen Kombinationen das
Auftreten isomerer Hydrazone nicht beobachtet werden
konnte.

2. Racematbildung war nur in einem einzigen Fall festzustellen, nämlich bei dem p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazon des Phenacyl-p-toluidins. Anilidobenzoin und m-Nitrophenacyl-p-toluidin hingegen lieferten nur die normalen beiden Stereoisomeren.

Praktischer Teil.

A. Verwendung primärer Hydrazine.

1. Versuche zur Darstellung des m-Pyridylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

Die Gewinnung des Hydrazins



erfolgte nach Angaben von Binz¹⁾ über das 3-Aminopyridin, das nach Diazotierung der Reduktion mittels Zinnchlorür unterworfen wird. Beim Freimachen der Base aus dem Zinndoppelsalz empfiehlt es sich mit einer sehr konzentrierten Lauge zu arbeiten, da die beträchtliche Wasserlöslichkeit des freien Hydrazins sonst einen starken Ätherverbrauch verursacht. Aus dem ätherischen Auszug wurde das Hydrazin als salzsaures Salz gefällt: weiße Nadeln, die über 200° erhitzt, langsam verkohlten.

a) Anwendung des salzsauren Salzes.

α) 0,84 g salzsaures m-Pyridylhydrazin und die entsprechende Menge Natriumacetat wurden in etwa 15 ccm Äthylalkohol umgesetzt. Zu dem erhaltenen Filtrat gab ich die ebenfalls kalte Lösung von 1 g Phenacyl-p-toluidin (25% Überschuß an Hydrazin). Sowohl 24 stündiges Stehen, wie 3 stündiges nachträgliches Erwärmen auf dem Wasserbad (40—50°) führten zu keinem Erfolg. Nach Abkühlung

1) B 68, I 320.

wurde mit Wasser bis zur beginnenden Trübung versetzt, wobei sich gelbe Nadeln auschieden, die sich als unverändertes Keton erwiesen ($F = 134^{\circ}$). Weiterer Wasserzusatz lieferte rote Öle, die nach längerem Stehen sich immer dunkler färbten und intensiven Isouitralgeruch annahmen.

β) Ansatz wie oben. Nach achtfündigem Erwärmen auf dem Wasserbad auf 50° wurde noch 12 Stunden verschlossen im Dunkeln stehen gelassen. Nach teilweisem Verdunsten des Alkohols beginnen sich gelbe Kristalle abzuscheiden ($F = 132-150^{\circ}$). Eine Untersuchung mit der Lupe zeigte, daß ein Gemenge von zwei verschiedenen Körpern vorlag. Durch die Behandlung mit warmen Äthylalkohol konnte eine Trennung herbeigeführt werden. Die als schwerer löslich zurückbleibenden Blättchen erwiesen sich als Keton, während aus dem Filtrat hellgelbe Nadelchen anfielen: $F = 167^{\circ}$ unter Rotfärbung. Dieselben waren, nach der Analyse zu schließen, das bereits im theoretischen Teil erwähnte Umlagerungsprodukt des Ketons.

Mikrostickstoffbestimmung:

3,046 mgr Sbft. : 0,165 ccm N ($16,5^{\circ}$, 742 mm)

$C_{15}H_{15}NO$ ber. N = 6,22%, gef. N = 6,18%.

Nach weiterem Wasserzusatz zur Kondensationsflüssigkeit schied sich ein dunkelrotes Öl ab, das ich durch verreiben mit Alkohol teilweise kristallin erhielt und auf diese Weise noch mehr von dem Umwandlungsprodukt isolieren konnte.

b) Anwendung der freien Base.

3 g m-Pyridylhydrazin wurden in 20 ccm Chloroform gelöst und zusammen mit einer Lösung von 7 g Phenacyl-p-toluidin in Chloroform sechs Stunden lang auf dem Wasserbad auf etwa 50° erhitzt. Ergebnis: Das Keton konnte neben Öl wieder zurückgewonnen werden.

c) Zusammenschmelzen der Komponenten.

0,5 g salzsaures m-Pyridylhydrazin und 0,6 g Phenacyl-p-toluidin wurden feinst pulverisiert und gemischt. Die Mischung brachte ich in ein Reagenzglas, das in einem Schwefelsäurebad erhitzt wurde. Bei $120-125^{\circ}$ begann sie

zu schmelzen. Nachdem die Wasserabscheidung beendet war, wurde mit Chloroform behandelt, wobei etwa 0,2 g salzsaures Hydrazin als unlöslich zurückblieben. Nach längerer Zeit schieden sich gelbe Nadelchen ab, doch war die Ausbeute so gering, daß eine Analyse nicht möglich war. Der Schmelzpunkt lag bei 165° und wie ein Mischschmelzpunkt ergab, lag auch hier das bereits erwähnte Umlagerungsprodukt des Ketons vor. Aus der Mutterlauge fiel weiterhin Öl an.

2. Darstellung des p-Nitrophenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

Da die geringe Löslichkeit des Hydrazins in Alkohol viel Lösungsmittel erfordert hätte, wurde bei diesen Versuchen Dioxan in Anwendung gebracht.

α) 1,25 g p-Nitrophenylhydrazin wurden mit 1,65 g Phenacyl-p-toluidin in der nötigen Menge Dioxan gelöst und 3 Stunden auf Siedetemperatur (ca 100°) erhitzt. Schon während des Erwärmens schieden sich hellrote Kristalle ab. Über Nacht hatten sich weiterhin rote Nadeln (0,2 g) aus der Lösung abgeschieden. Das Produkt war sowohl in Dioxan, als auch in Äther, Alkohol, Benzol und Petroläther nahezu unlöslich. Dagegen ließ es sich aus heißem Pyridin nach Zugabe von $\frac{1}{3}$ Volumen Alkohol in roten verfilzten Nadelchen erhalten. Der Schmelzpunkt lag ungewöhnlich hoch bei 273° (h-Form).

Mikrostickstoffbestimmung:

2,287 mgr Sbft. 0,325 ccm N (19° , 730 mm)

$C_{21}H_{20}N_4O_2$ ber. N = 15,56% gef. N = 15,7%.

Aus der Mutterlauge kristallisierte auf Wasserzusatz unverändertes Hydrazin und Keton neben Öl aus.

β) 0,5 g p-Nitrophenylhydrazin wurden mit 0,67 g Phenacyl-p-toluidin gemischt und im Reagenzglas zwei Stunden im siedendem Wasserbad erhitzt. Es trat allmählich Rotfärbung ein. Bei Behandlung mit Chloroform blieb das unter α erhaltene Hydrason zurück. Die Lösung wurde mit dem gleichen Volumen Alkohol versetzt, worauf nach einiger Zeit ein harziges Produkt anfiel. Unter dem Mikroskop betrachtet, erkannte man feine Krysfällchen die von

Öltröpfchen umschlossen waren. Eine einwandfreie Trennung gelang beim Behandeln mit kaltem Benzol, wobei die Krystalle als unlöslich in Form gelber Nadeln zurückblieben: $F=153^{\circ}$ (n-Form).

Mikrostickstoffbestimmung:

3,028 mgr Sbft. 0,420 ccm N (21° , 734 mm)

$C_{21}H_{20}N_4O_2$ ber. N = 15,56% gef. N = 15,26%.

Die Ausbeute an n- und h-Form betrug je 0,1 g (= 15%).

3. Darstellung des 2,4-Dinitrophenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

0,62 g 2,4-Dinitrophenylhydrazin wurden mit 0,6 g Phenacyl-p-toluidin im Schwefelsäurebad bei 131° zusammen geschmolzen. Durch Behandlung mit Chloroform wurde von unverändertem Hydrazin getrennt und nach Zugabe von Alkohol krystallisierte ein gelbbrauner Körper in feinen Nadeln aus. Derselbe zeigte gute Löslichkeit in Chloroform, während er in Alkohol schwerer löslich war. Durch Umkrystallisation aus einem Chloroform-Alkoholgemisch erhielt ich ihn in gelbbraunen Nadeln $F=187^{\circ}$. Er erwies sich als die n-Form.

Mikrostickstoffbestimmung:

2,238 mgr Sbft. 0,352 ccm N (20° , 730 mm)

$C_{21}H_{19}N_5O_4$ ber. N = 17,29% gef. N = 17,2%.

Die Ausbeute betrug 20%.

Gleichzeitig wurde ein Versuch angelegt, wobei das Gemisch 2 Stunden lang im siedenden Wasserbad erhitzt wurde. Die Masse sinterte dabei zu einem schwarzen Produkt zusammen. Nach dem Behandeln mit Chloroform-alkohol erhielt ich braune derbe Nadeln, die nach mehrmaligem Umkrystallisieren aus heißem Alkohol bei 203° schmolzen. Es lag hier, wie die Mikrostickstoffbestimmung ergab, die h-Form des Hydrazons vor.

Mikrostickstoffbestimmung:

2,434 mg Sbft. 0,379 ccm N (20° , 735 mm)

$C_{21}H_{19}N_5O_4$ ber. N = 17,29% gef. N = 17,22%.

Aus der Reaktionsflüssigkeit wurde das Chloroform ent-

fernt und vorsichtig mit Wasser versetzt. Dabei fiel neben Öl ein kristalliner Körper an. Durch 5—6 maliges Umkristallisieren aus Chloroformalkohol konnte ich denselben in mäßiger Reinheit erhalten. Der Schmelzpunkt lag zwischen 156 und 160°. Eine Analyse war wegen der geringen Menge nicht möglich, doch konnte ich auf Grund eines Mischschmelzpunktes feststellen, daß hier das umgelagerte Keton vorlag.

B. Verwendung sekundärer Hydrazine.

1. Darstellung des N-Methyl-p-Nitrophenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des N-Methyl-p-nitrophenylhydrazins.

Methylierung von p-Nitranilin¹⁾.

Nitroso-p-Nitromethylanilin²⁾.

5 g p-Nitrophenyl-N-Methylnitrosamin ($F = 104^0$) wurden in 100 ccm Alkohol unter Erwärmung gelöst. Beim Abkühlen sich etwa wieder auscheidendes Nitrosamin wurde mittels Chloroform in Lösung gebracht. Darauf wurde mit 20—30 ccm konzentriertem Ammoniak versetzt und unter Wasserkühlung mit dem Einleiten des Schwefelwasserstoffes begonnen. Das Einleiten geschah in langsamer Blasenfolge (pro Sekunde 1 Blase) und wurde, da für die Beendigung der Reaktion kein entscheidendes Kriterium vorhanden war, nach 2½ Stunden unterbrochen. Von etwa ausgeschiedenem Schwefel wurde abfiltriert und das Chloroform im Vakuum bei gewöhnlicher Temperatur entfernt. Nach restlosem Entfernen des Chloroforms versetzte ich die Lösung vorsichtig mit Wasser bis zur beginnenden Trübung und ließ über Nacht stehen. Die hierbei ausgeschiedenen rotbraunen mattglänzenden Drußen wurden abgesaugt und das Filtrat weiter mit Wasser versetzt, bis keine Fällung mehr erfolgte. Die vereinigten Kristallisationen wurden nun, um sie vom beigemengten Schwefel zu befreien, wie folgt behandelt: Ich löste das Rohprodukt

1) Ullmann, A 327, 113.

2) Ullmann, A 327, 113.

(etwa 3 g) in heißem 60%igem Aethylalkohol und ließ erkalten. Dabei schied sich der Schwefel in langen Nadeln ab, die entfernt wurden. Durch Eindampfen der alkoholischen Flüssigkeit fiel das Hydrazin an. Diese Operation mußte, um ein völlig schwefelfreies Hydrazin zu erhalten, des öfteren wiederholt werden.

Bei nicht exakter Einhaltung der niederen Temperatur beim Behandeln mit Schwefelwasserstoff wandelte sich ein Teil des Nitrosamins in das Amin um ¹⁾. Um hier eine befriedigende Trennung zu erreichen, löste ich das Gemisch in warmem Benzol und fügte etwa die gleiche Menge Petroläther zu. Nach längerem Stehen schied sich das Amin zuerst ab. Aus der Mutterlauge erhielt ich das Hydrazin durch Einengen. — Das auf diese Weise dargestellte p-Nitrophenyl-N-Methylhydrazin stimmte mit dem von Ciuşa und Rastelli ²⁾ auf anderem, aber umständlichem Wege hergestellten in seinen Eigenschaften überein: gelbbraune Nadelchen mit violetterm Schimmer. $F = 158^{\circ}$ (Ciuşa, Rastelli: 156°). Die Ausbeute betrug 30 % der Theorie.


Mikrostickstoffbestimmung:

1,604 mg Sbft. 0,359 ccm N ($26,5^{\circ}$, 740 mm)

$C_7H_9N_3O_2$ ber. N = 25,15 % gef. N = 24,76 %

b) Kondensationsversuche.

Zur Darstellung des Phenacyl-p-toluidin-nitrophenylmethylhydrazons



wurden 0,5 gr N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin und 0,5 gr Phenacyl-p-toluidin in der eben nötigen Menge kaltem Chloroform gelöst und 24 Stunden gut verschlossen im Dunkeln stehen gelassen. Anschließend ließ ich das Lösungs-

1) J. Pinnow, B. 31, III, 2928.

2) Gaz. chim. ital. 52, II, 127.

mittel auf etwa die Hälfte abdunsten und versetzte mit dem gleichen Volumen Äthylalkohol. Sofort setzte KrySTALLISATION ein. Die abgeschiedenen gelben Nadeln wurden abgesaugt ($F = 114-125^{\circ}$) und die Mutterlauge, nachdem alles Chloroform entfernt war, vorsichtig bis zur beginnenden Trübung mit Wasser versetzt. Die angefallenen gelben Nadeln waren mit den obigen identisch. Wie aus dem Schmelzpunkt ersichtlich, war das Produkt nicht einheitlich. Ein fraktioniertes KrySTALLISIEREN aus Äthylalkohol, wie aus Benzol-Petroläther erwies sich für die Trennung als erfolglos. Erst das Behandeln mit heißem Ligroin führte zum gewünschten Ziel. Als unlöslich blieben feine verfilzte, gelbe Nadelchen zurück $F = 137^{\circ}$. Leider war die Ausbeute so gering, daß weder ein UmkrySTALLISIEREN noch eine Analyse in Frage kam. Aus dem heißen Filtrat schieden sich beim Erkalten lange gelbe Nadeln aus: $F = 115-116^{\circ}$, die auch nach nochmaliger Reinigung mittels Alkohol den Schmelzpunkt nicht veränderten.

Mikrostickstoffbestimmung:

4,346 mg Sbst. 0,576 ccm ($26,5^{\circ}$, 742 mm)

$C_{22}H_{22}N_4O_2$ ber. N = 14,98 % gef. N = 14,8 %

Es bestand nun die Möglichkeit, daß der 137° -Körper ebenfalls ein Hydrazon darstellte. Aus diesem Grunde mußte ich versuchen, denselben in besserer Ausbeute zu erlangen. Zu diesem Zwecke wurde die Lösung von 1 g N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin und 1,05 gr Phenacyl-p-toluidin 3 Stunden lang auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Wie im vorhergehenden Versuch ließ ich das Chloroform auf die Hälfte abdunsten und versetzte mit Alkohol. Schließlich erhielt ich ein aus Nadeln und Blättchen bestehendes Gemisch, das zwischen 112° und 145° schmolz. Die Ausbeute betrug etwa 1 g = 60 % der Theorie. Aus der Mutterlauge fiel durch weiteren Wasserzusatz das bekannte schmierige Öl als Zeretzungsprodukt des Ketons an.

Das oben erhaltene KrySTALLGEMISCH wurde nun zum Zwecke der Trennung mit heißem Ligroin behandelt. Aus der Lösung schied sich das schon bekannte Hydrazon ($F = 115^{\circ}$) in feinen hellgelben Blättchen ab. Der unlös-

liche Rückstand wurde in heißem Alkohol aufgenommen. Beim langsamen Abkühlen kristallisierten lange, matte, gelbbraune Nadeln ($F = 164^{\circ}$), während aus dem Filtrat durch Wasserzusatz kleine gelbe verfilzte Nadelchen $F = 137^{\circ}$ erhalten wurden. Die gelbbraunen Nadeln (ungefähr 0,3 g) waren, wie ein Mischschmelzpunkt erwies, mit dem bereits des öfteren erwähnten Umlagerungsprodukt des Ketons identisch. Von einer Analyse wurde abgesehen.

Die dritte Kristallform wurde zwecks Reinigung nochmals aus Alkohol umkristallisiert, wobei der Schmelzpunkt auf 139° stieg, und dann einer Stickstoffanalyse unterzogen.

Stickstoffbestimmung:

2,295 mg Sbft. 0,316 ccm N (19° , 730 mm)

$C_{22}H_{22}N_4O_2$ ber. N = 14,98% gef. N = 15,46%

Darnach mußte hier die h-Form des Hydrazons vorliegen. Eigentümlicherweise war hier wie in den vorhergehenden Kondensationsversuchen die Ausbeute gegenüber der n-Form sehr gering.

Um nun evtl. die racemische Form zu erhalten, wurden gleiche Teile der beiden Isomeren in Benzol gelöst und bis zur beginnenden Trübung mit Petroläther versetzt. Nachdem über Nacht an einem kühlen Ort gut verschlossen stehen gelassen wurde, wurden die langen gelben Nadeln, die sich an den Wandungen abgeschieden hatten abgesaugt und getrocknet: $F = 152^{\circ}$.

War nun der obige Körper das Racemat, so mußte es gelingen ihn auch durch Kondensation zu erhalten. Zu diesem Zwecke wurden 0,2 g N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin und 0,2 g Aminoketon gepulvert, gemischt und wie in den früheren Versuchen im Schwefelsäurebad zusammen geschmolzen. Bei 112° wurde das Gemisch flüssig und es begann die Wasserabscheidung. Die Temperatur wurde 15 Minuten lang konstant gehalten, wobei die Schmelze sich langsam rot färbte. Nach dem üblichen Behandeln mit Chloroform-Alkohol erhielt ich als erstes Produkt lange gelbe derbe Nadeln, die aus Alkohol umkristallisiert den Schmelzpunkt bei 150° zeigten. Aus der Mutterlauge erfolgte weitere Abscheidung von gelben Kry-

stallen, die nach völliger Entfernung des Chloroforms abgeseugt wurden ($F = 112-140^\circ$). Mit dem Mikroskop waren deutlich zwei Kristallarten zu erkennen: derbe Nadeln und feinere Nadelchen. Zur Durchführung der Trennung wurde das Gemisch in heißem 96%igem Äthylalkohol gelöst und von etwaigen Verunreinigungen durch Filtrieren befreit. Beim Erkalten schieden sich lange, prächtige, intensiv gelb gefärbte Nadeln ab; aus der Mutterlauge erhielt ich durch Wasserzusatz ebenfalls gelbe, aber kleine versilzte Nadelchen. Durch in eben angeführter Weise wiederholtes Umkristallisieren erhielt ich schließlich die langen Nadeln im reinen Zustand: $F = 150^\circ$, Dunkel-färbung. Der zweite Körper hatte auch nach dieser Operation den noch ungenauen Schmelzpunkt $115-140^\circ$. Doch führte auch hier ein Weg zum Ziel. Bei Behandlung mit 60%igem Methanol blieb die n-Form als schwerer löslich zurück, während aus der Lösung, wenn auch in ganz verschwindender Menge die h-Form anfiel. Die Ausbeute an Gesamtprodukt betrug annähernd 40% der Theorie; aus der Urmutterlauge konnte durch Wasserzusatz das ölige Zer-setzungsprodukt des Ketons festgestellt werden.

Mikrostickstoffbestimmung:

7,112 mg Sbft. 0,965 ccm N (24° , 742 mm)

$C_{22}H_{22}N_4O_2$ ber. N = 14,97 % gef. N = 15,22 %

Das Racemat wurde nun zwecks Zerlegung in einem Überschuß von Chloroform gelöst und mit dem gleichen Volumen Aethylalkohol versetzt. Nach langsamem Abdunsten des Chloroforms wurden zwei Kristallformen sichtbar: schöne gelbe Nadelchen und mattgelbe feine Kriställchen. Durch mechanische Trennung konnte ich mittels Schmelzpunkt wenigstens ungefähr die beiden Isomeren erkennen. Damit durfte die Racematbildung des N-Methyl-p-nitrophenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins als eindeutig erwiesen angesehen werden.

Ergebnis: Stereoisomere: n-Form $F = 115-116^\circ$

h-Form $F = 139^\circ$

Racemat: $F = 150^\circ$.

2. Darstellung des N-Benzyl-p-nitrophenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des N-Benzyl-p-nitrophenylhydrazins.

Der präparative Gang war der gleiche wie bei der Methylverbindung.


Das erhaltene Produkt stimmte im Schmelzpunkt ($F = 121^\circ$) und Reduktionsercheinungen mit dem von Ciufa und Rastelli¹⁾ durchaus überein. Die Ausbeute betrug 30 % der Theorie.

Mikrostickstoffbestimmung:

3,812 mg Sbft. 0,575 ccm N (20° , 740 mm)

$C_{13}H_{13}N_3O_2$ ber. N = 17,28 % gef. N = 17,11 %

b) Kondensationsversuche.



Die Versuche in der Kälte zu kondensieren scheiterten, auch nach Zugabe von einigen Tropfen Eisessig oder alkoholischer Salzsäure. Es wurden in allen Fällen die Komponenten quantitativ zurückerhalten. Aus diesem Grunde mußte die Versuchsreihe durch Erwärmen auf dem Wasserbad weitergeführt werden.

1 g N-Benzyl-p-Nitrophenylhydrazin wurden mit 0,7 g Phenacyl-p-toluidin in Chloroform gelöst und zwei Stunden lang auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Daraufhin wurde die Lösung mit Alkohol versetzt und der Kristallisation überlassen, wobei zwei Fraktionen festgestellt wurden:

1. intensiv gelb gefärbte Blättchen mit daraufstehenden braunen Drüsen $F = 110-130^\circ$.
2. kleine gelbe quadratische Blättchen und braungelbe Nadelchen $F = 94-100^\circ$.

1) Gaz. chim. ital. 54, 72-78.

Zu 1. Die Trennung ließ sich auf Grund der verschiedenen Löslichkeit in heißem gewöhnlichen Alkohol erreichen. Durch öfteres Behandeln auf diese Weise gelang es schließlich die schwerer löslichen Druſen von den Blättchen zu trennen. Erstere wurden aus Äthylalkohol umkryſtallisiert und ſchmolzen konſtant bei 136° . Aus der Lösung kryſtallisierten beim Erkalten und nachherigem Waſſerzuſatz glänzende Blättchen $F=116^{\circ}$. Dieſelben erſchienen durchaus einheitlich und änderten auch nach öfterem Umkryſtallisieren ihren Schmelzpunkt nicht. Es war alſo naheliegend, hier mit verſchiedenen Formen der Hydrazone zu rechnen.

Mikroſtickſtoffbeſtimmung: $F=136^{\circ}$

3,961 mg Sbſt. 0,433 ccm N (21° , 730 mm)

$C_{28}H_{26}N_4O_2$ ber. N = 12,44 % gef. N = 12,19 %.

Mikroſtickſtoffbeſtimmung: $F=116^{\circ}$

3,340 mg Sbſt. 0,290 ccm N (21° , 734 mm)

$C_{28}H_{26}N_4O_2$ ber. N = 12,44 % gef. N = 9,7 %.

Nach den Analyſen zu ſchließen waren die Druſen das Hydrazon, während die einheitlich erſcheinenden Blättchen vermutlich noch ein Gemiſch aus Keton (6,2 % N) und Hydrazon (12,44 % N) darſtellten. Es mußte alſo ein Weg gefunden werden, dieſe beiden Komponenten zu trennen. Nach vielen Verſuchen zeigte ſich die Miſchung von Benzol und Petroläther als günſtig. Nach mehrtägigem Stehen hatten ſich im Kölbchen deutlich ſichtbar zwei verſchiedene Kryſtallformen abgeſchieden. Außer den gelben Blättchen erkannte ich noch dunkler gefärbte Säulchen. Nach Abgießen des Löſungsmittels wurde die Trennung mit Äthylalkohol verſucht. Die Säulchen blieben als ſchwerer löslich zurück und zeigten ſich identiſch mit dem bereits erwähnten Hydrazon ($F=136^{\circ}$). Aus der alkoholischen Löſung ſchieden ſich ſchließlich die Blättchen ab, die nochmals aus Chloroformalkohol umkryſtallisiert ſich als Keton ($F=134^{\circ}$) erwieſen.

Zu 2. Das Gemiſch wurde genau wie unter 1 behandelt und führte ebenfalls zu Keton und Hydrazon.

Aus der Mutterlauge fiel auf Wasserzusatz Öl aus. Ausbeute an reinem Hydrazon betrug 35—40 % der Theorie.

Als weiterer Versuch wurde eine Kondensation durch Zusammenschmelzen angesetzt. Dabei wurden 0,2 g Keton mit der entsprechenden Menge Hydrazin im Schwefelsäurebad bei 108° zusammen geschmolzen und etwa 15 Minuten auf der Temperatur gelassen. Es erfolgte deutliche Wasserabscheidung und Dunkelfärbung. Nach der bekannten Behandlungsweise gelangte ich so zu zwei Kristallformen: gelbe Blättchen und kleine gelbe Nadeln. Sie wurden durch öfteres Lösen in Äthylalkohol getrennt, wobei als unlöslicher Anteil hellgelbe winzige Nadelchen zurückblieben: $F = 148^\circ$. Aus der Lösung erhielt ich zwei Kristallisationen: 1. hellgelbe glänzende Blättchen $F = 109—123^\circ$. 2. orangefarbene Nadelchen $F = 123,5^\circ$. Beim Behandeln der beiden Fraktionen mit Benzol-Petroläther, wie im vorigen Versuch näher beschrieben, erhielt ich das Hydrazon und das Keton. Die gelben Nadelchen ($F = 148^\circ$) erwiesen sich, wie schon nach dem Schmelzpunkt zu erwarten war als p-Nitrophenyl-Benzylamin ($F = 147^\circ$).

Mikrostickstoffbestimmung:

4,5975 mgr Sbft. 0,500 ccm N (21°, 740 mm)

$C_{13}H_{12}N_2O_2$ ber. N = 12,28% gef. N = 12,29%.

Das Ergebnis der Versuche war also stets nur eine Form des Hydrazons. Die Bemühungen dieselbe durch Chloroform-Alkohol zu zerlegen oder durch Schmelzen in eine andere überzuführen verliefen ergebnislos, sodaß man es hier stets mit der Bildung der stabilen h-Form zu tun hatte.

3. Darstellung des m-Nitrophenyl-N-Methylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des N-Methyl-m-nitrophenylhydrazins.

8 g Nitrosamin¹⁾ wurden in Alkohol und etwas Chloroform gelöst und mit überschüssigem Ammoniak versetzt. Die Lösung wurde bei gewöhnlicher Temperatur (5—10°) während zwei Stunden mit einem langsamen Schwefel-

1) B 19, 3250.

wasserstoffstrom gesättigt. Hierbei schieden sich aus der Lösung, die sich allmählich dunkel färbte, rotbraune Nadeln ab. Nach dem Abfiltrieren wurde das Chloroform bei gewöhnlicher Temperatur im Vakuum abgesaugt und dann die Lösung mit Wasser bis zur beginnenden Trübung versetzt. Nach mehrstündigem Stehen fielen weiterhin rotbraune Nadeln an. Die Gesamtmenge wurde nun aus Alkohol umkristallisiert und ich erhielt so gelbbraune Nadeln: $F = 70-72^\circ$. Um ein schwefelfreies Produkt zu erhalten, mußte die Umkristallisation des öfteren wiederholt werden. Die Ausbeute an reinstem Produkt betrug 40%.


Mikrostickstoffbestimmung:

3,352 mg Sbft. 0,747 ccm N (21° , 738 mm)

$C_7H_9N_3O_2$ ber. N = 25,15% gef. N = 25,13%

b) Kondensationsversuche.

Zur Darstellung des Phenacyl-p-toluidin-m-nitrophenyl-N-Methylhydrazons



wurden 2 g Hydrazin in Chloroform mit der entsprechenden Menge Keton 3 Stunden lang auf dem Wasserbad erwärmt (70°). Nachdem das Chloroform zur Hälfte abgelaufen war, wurde mit Alkohol versetzt, wobei sich große gelbe Blätter abschieden, die sich als unverändertes Keton erwiesen. Auch das Hydrazin wurde fast quantitativ zurückerhalten.

Auch der Versuch des Zusammenschmelzens verlief ergebnislos. 0,7 g Phenacyl-p-toluidin und 0,7 g N-Methyl-m-nitrophenylhydrazin wurden bei 130° im Schwefelsäurebad zusammengesmolzen. Dabei trat lebhaft Zersetzung auf, während die Schmelze sich dunkel färbte. Nach Behandlung mit Chloroform-Alkohol schieden sich zuerst gelbe Nadeln ab, die sich als Umwandlungsprodukt des Ketons erwiesen ($F = 164^\circ$).

Mikrostickstoffbestimmung:

6,964 mg Sbft. 0,416 ccm N (21°, 732 mm)

C₁₅H₁₅NO ber. N = 6,22 % gef. 6,47 %

Dann folgten braungelbe Blättchen, die sich nach UmkrySTALLISIEREN als Keton herausstellten (F = 134°). Aus der Mutterlauge fiel auf Wasserzusatz ein schmieriges rotes Öl an, das nicht mehr krySTALLIN erhalten werden konnte. Vermutlich war es ein ZerSetzungsprodukt des Hydrazins. — Auch die Versuche durch Zugabe von einigen Tropfen Eisessig oder alkoholischer Salzsäure Kondensation herbeizuführen blieben erfolglos. Bei den Bemühungen durch fünfständiges Erhitzen in der Wasserbadkanone Reaktion zwischen den Komponenten zu erzwingen, erhielt ich schließlich ein rotbraunes Öl, aus dem ein einheitliches Produkt nicht zu isolieren war.

4. Darstellung des N-Methyl-p-benzoesäurehydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des Carbonsäurehydrazins.

Als Ausgangsmaterial verwendete ich den p-Aminobenzoesäure-äthylester, den ich nach Houben u. Schottmüller¹⁾ mit Dimethylsulfat in wässriger alkalischer Lösung methylierte. Die Trennung des Monomethyl-p-aminobenzoesäureesters vom Dimethyl-p-aminobenzoesäureester erfolgte durch Nitrosierung. Das entstandene Nitrosamin fiel in gelben derben Drusen an (F = 57°). Die Reduktion des Nitrosamins erfolgte nach Emil Fischer. Beim Abdampfen des Äthers erschienen weiße KrySTALLE mit etwas dunklem Öl. Beide lösten sich spielend im Wasser, wobei alkalische Reaktion auftrat. Es hatte also im Laufe des Präparates eine Verseifung des Esters stattgefunden. Bei Zugabe von verdünnter Salzsäure zur wässrigen Lösung fielen weiße KrySTALLE in Sternchenform an, die aus Alkohol umkrySTALLISIERT wurden und einen Schmelzpunkt bei 223—225° zeigten. Dabei wurde ZerSetzung beobachtet.

1) B. 42, 3739—3740.

Mikrostickstoffbestimmung:


3,060 mg Sbft. 0,460 ccm N (21°, 727 mm)

 $C_8H_{11}N_2O_2$ ber. N = 16,76 % gef. N = 16,7 %

Das Hydrazin zeigte Reduktionswirkungen gegenüber Fehling und ammoniakalischer Silberfälschung. In Wasser, Alkohol und Eisessig war es leicht löslich, weniger in Chloroform und Äther. Schwerlöslichkeit zeigte das Carbonsäurehydrazin gegenüber Benzol.

b) Kondensationsversuche.

Zur Darstellung des N-Methyl-p-benzoesäurehydrazons des Phenacyl-p-toluidins



wurden 1,25 g Hydrazin mit 1,4 g Keton in der nötigen Menge Chloroform gelöst und 2½ Stunden auf dem Wasserbad auf etwa 70° erwärmt. Beim Erkalten kristallisierte ein Gemisch von Keton und Hydrazin wieder aus, das ich leicht mechanisch trennen konnte. Nach Zugabe von Alkohol erhielt ich nochmals unverändertes Keton zurück. Erst nachdem alles Chloroform abgedampft war, erfolgte die Abscheidung von farblosen Kriställchen, die zwischen 175 und 178° unter lebhafter Zersetzung schmolzen. Nach Umkristallisieren aus Ätheralkohol stieg der Schmelzpunkt auf 187°. Leider ergab die Analyse auch nach wiederholten Reinigungsversuchen nie den gewünschten Wert, sondern zeigte in allen Fällen ein Zuviel um 0,9%. Die Ausbeute an diesem Produkt betrug etwa 15%.

Mikrostickstoffbestimmungen:

I. 2,293 mg Sbft. 0,250 ccm N (20°, 740 mm)

 $C_{23}H_{24}N_3O_2$ ber. N = 11,23 % gef. N = 12,13 %

II. 3,325 mg Sbft. 0,355 ccm N (20°, 740 mm)

 $C_{23}H_{24}N_3O_2$ ber. N = 11,23 % gef. N = 12,11 %

Die Zugabe von Katalysatoren zu den Kondensations-

versuchen, sowie die Möglichkeit auf der Wasserbadkanone zum Ziele zu kommen, blieben ohne Erfolg. Im ersten Fall erhielt ich die Komponenten wieder zurück, während im zweiten Falle nur schmierige Öle anfielen.

5. Versuche zur Darstellung des N-Methyl-p-benzoesäure-äthylesterhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des N-Methyl-p-hydrazinobenzoesäureesters.

Dieselbe erfolgte wie unter 4a angegeben. Um eine Verseifung des Esters zu verhüten wurde jedoch nach erfolgter Reduktion des Nitrosamins nicht mit Lauge, sondern mit konzentriertem Ammoniak weitergearbeitet. Die ammoniakalische Lösung wurde mit Äther kräftig durchgeschüttelt und nach Trennung der beiden Schichten die ätherische Lösung nochmals mit reinem Wasser behandelt, um Alkohol und Ammoniak daraus zu entfernen. Nach Abdampfen des Äthers erschien ein öliges Rückstand, der in eiskaltem Wasser suspendiert wurde. Nach mehrstündigem Stehen war das Öl kristallin geworden. Durch Umkristallisation erhielt ich gelblich-weiße Nadelchen. Es empfiehlt sich mit einer möglichst verdünnten alkoholischen Lösung zu arbeiten, da sonst stets Öl anfällt. Das so erhaltene Rohprodukt $F = 56^0$ war sehr gut aus Petroläther oder Leichtbenzin umzukristallisieren. Aus ersterem erschien es in schneeweißen Nadelbüscheln, aus letzterem in langen feinen Nadeln. $F = 66^0$.


Mikrostickstoffbestimmung:

2,657 mg Sbft. 0,341 ccm N (20^0 , 735 mm)

$C_{10}H_{14}N_2O_2$ ber. N = 14,44 % gef. N = 14,46 %.

b) Kondensationsversuche.

Die Versuche zur Darstellung des Phenacyl-p-toluidin-N-Methyl-p-benzoesäure-äthylesterhydrazons




verliefen in der Kälte wie auf dem Wasserbad auch nach Zugabe von Kondensationsmitteln ergebnislos. Um evtl. doch zu einem Ergebnis zu kommen wurden 0,5 g Hydrazin mit 0,48 g Keton in Chloroform gelöst und 2 Stunden auf der Wasserbadkanone erhitzt. Dabei konnte ich drei Fraktionen feststellen:

1. Feine gelbe Nadelchen $F = 201-204^{\circ}$ unter lebhafter Zersetzung.
2. Hellgelbe Blättchen, an denen Öltröpfchen hingen. $F = 128^{\circ}$.
3. Durch Wasserzusatz aus der Mutterlauge: Dunkelrotes Öl mit Isonitrilgeruch.

Zu 1. Ausbeute betrug nur einige Milligramm, weshalb keine Analyse gemacht werden konnte. Wie im theoretischen Teil schon erwähnt, scheint es hier zur Hydrazidbildung gekommen zu sein.

Zu 2. Gelöst in Chloroform und mit Alkohol versetzt. Daraus kristallisierte reines Keton in schönen gelben Blättchen. Aus der Lösung schied sich auf Wasserzusatz ein dunkelrotes Öl ab, das mit dem unter 3 als Zersetzungsprodukt des Ketons identisch war.

6. Darstellung des p-Nitrobenzyl-phenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.



0,7 g salzsaures p-Nitrobenzyl-phenylhydrazin wurden mit 0,46 g Phenacyl-p-toluidin 3 Stunden lang in Chloroform auf dem Wasserbad erwärmt (50°). Dabei trat langsame Dunkelfärbung auf. Nach Zusatz von Äthylalkohol erhielt ich bei langsamem Verdunsten des Chloroforms ein dunkelrotes Öl, das ich auf 2 Arten kristallin erhalten konnte:

1. Durch Verreiben mit absolutem Äther
2. Das Öl wurde in Eisessig gelöst, woraus auf Wasserzusatz rotbraune winzige Nadelchen anfielen.

Durch UmkrySTALLISATION aus Chloroform-Alkohol resultierten schließlich winzige derbe rotbraune Druſen, die bei 137,5° unter geringer Zersetzung zu einem zähflüssigen Öl schmolzen.

Mikrostickstoffbestimmung:

6,371 mg Sbſt. 0,715 ccm N (21°, 737 mm)

$C_{28}H_{26}N_4O_2$ ber. N = 12,44 % gef. N = 12,63 %.

Eine Zerlegung des Hydrazons gelang nicht.


7. Darstellung des p-Bromphenyl-N-Methylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des N-Methyl-p-bromphenylhydrazins.

Aus dem p-Brom-N-Methylanilin¹⁾ wurde durch Nitrosieren das Nitrosamin, das sich als weißer Körper abschied (F = 74°), erhalten. Nach dem Reduktionsverfahren nach Emil Fischer erhielt ich das gewünschte Hydrazin in Form eines gelbrot gefärbten Öles. Daselbe zeigte gegenüber ammoniakalischer Silbersalzlösung und gegenüber Fehling'scher Lösung lebhaftere Reduktionswirkungen. Aus 15 g Nitrosamin erhielt ich 10 g Hydrazin.

b) Kondensationsversuch.

Zur Darstellung des p-Bromphenyl-N-Methylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins



wurden 1 g N-Methyl-p-bromphenylhydrazin und 0,9 g Phenacyl-p-toluidin in Chloroform gelöst und mit einem

1) A. 338, 125.

Tropfen alkoholischer Salzsäure versetzt. Gleich zu Anfang schieden sich hierbei gelbe Blättchen ab, die aus Chloroform-Alkohol umkrySTALLIERT, sich als Keton erwiesen. Nach längerem Stehen fielen orangegelbe Nadelchen an. Aus Alkohol umkrySTALLIERT schmolzen dieselben konstant bei 158°. Nach völligem Verdunsten des Lösungsmittels resultierte aus der Mutterlauge schließlich ein Öl, aus dem durch Verreiben mit Äther noch ein krySTALLINER Körper isoliert werden konnte. Das zurückbleibende rote Öl erwies sich, wie die Reduktionsercheinungen zeigten, als Bromphenyl-N-Methylhydrazin, während das krySTALLINE Produkt mit dem obigen identisch war (F=158°). Die Ausbeute an Hydrazon betrug 60%.


Mikrostickstoffbestimmung:

2,135 mg Sbft. 0,202 ccm N (21°, 730 mm)

C₂₂H₂₂N₃Br ber. N = 10,3% gef. N = 10,55%

Das Hydrazon erwies sich dabei als die stabile Form.

8. Darstellung des N-Methyl-p-sulfo[äure-phenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.



1 g N-Methylphenyl-hydrazino[sulfo[äure¹⁾] wurden in der alkoholischen Lösung der entsprechenden Menge Keton suspendiert und 7 Stunden lang auf dem Wasserbad zum Sieden erhitzt. Dabei ging langsam ein Teil des Hydrazins in Lösung. Dieselbe färbte sich dunkelrot. Nach 7 Stunden wurde von noch nicht gelöstem Hydrazin abfiltriert. Aus dem erkalteten Filtrat fielen auf vorsichtigem Wasserzusatz blaßgelb gefärbte Blättchen an, die zunächst zwischen 124 und 127° schmolzen. Aus Äthylalkohol umkrySTALLIERT erwiesen sie sich als Keton (F = 134°). Aus der alkoholischen Mutterlauge fielen auf weiterem Wasserzusatz schmutzig-gelb

1) A. 239, 219.

gefärbte Flocken an, die wiederholt aus Alkohol umkrySTALLISIERT wurden. Schließlich kam ich so zu zitronengelben glänzenden langen Nadeln $F = 131,5^{\circ}$.

Mikrostickstoffbestimmung:

2,215 mg Sbft. 0,198 ccm N (20° , 734 mm)

$C_{22}H_{24}N_3O_3S$ ber. N = 10,24 % gef. N = 10,13 %.

Aus der Mutterlauge erhielt ich durch weiteren Wasserzusatz ein dunkelrotes Öl vermischt mit gelben KrySTALLen. Durch Behandlung mit Äthylalkohol gelang es die schwer löslichen KrySTALLe von dem Öl abzutrennen. Sie zeigten einen Schmelzpunkt bei 125° , der jedoch nach wiederholtem UmkrySTALLISIEREN auf 131° stieg. Das dunkelrote Öl war das ZerSETZUNGSprodukt des Ketons. Eine Spaltung des Hydrazons gelang nicht.

9. Darstellung des N-Methyl-p-Cyan-Phenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins.

a) Darstellung des N-Methyl-p-Cyan-Phenylhydrazins.

p-Nitranilin wurde nach Sandmeyer¹⁾ in das 4-Nitrobenzonitril übergeführt und daselbe durch Reduktion in das 4-Aminobenzonitril umgewandelt²⁾. Daselbe wurde mit der nötigen Menge Dimethylsulfat behandelt. Zu diesem Zwecke erhitzte ich das Dimethylsulfat in einem Kölbchen auf dem siedenden Wasserbad und gab das Aminobenzonitril unter kräftigem Umschütteln in kleinen Portionen zu. Nach dem Erkalten wurde mit Eiswasser verdünnt und unter guter Kühlung nitrosiert. Das Nitrosamin war in Äthylalkohol leicht löslich und krySTALLISIERTE daraus in gelben Nadeln ($F = 125^{\circ}$) unter lebhafter ZerSETZUNG. Eine geringe Löslichkeit zeigte sich auch gegenüber Wasser.

Mikrostickstoffbestimmung:

4,200 mg Sbft. 0,972 ccm N (21° , 737 mm)

$C_8H_7N_3O$ ber. N = 26,09 % gef. N = 26,06 %.

Das Nitrosamin wurde nun der FISCHERschen Reduktion unterworfen. Da das isolierte Hydrazin keine KrySTALLISATIONSTENDENZ zeigte, sondern stets in voluminösen Flocken

1) B 18, 1492.

2) Am. Soc. 25, 481.

anfiel, wurde es in das salzsaure Salz übergeführt. Dasselbe war entgegen den bisherigen Erfahrungen über die Löslichkeit der Salze sekundärer Hydrazine ¹⁾ selbst in warmem Chloroform äußerst schwer löslich. Durch UmkrySTALLISATION aus absolutem Alkohol erhielt ich farblose Nadelchen, die bei 187° unter Zersetzung schmolzen.

Mikrostickstoffbestimmung:

3,530 mg Sbft. 0,705 ccm N (21°, 739 mm)

C₈H₁₀N₃Cl ber. N = 22,95% gef. N = 22,55%

Über das Wesen der Zersetzung des Hydrazins gab eine Analyse Aufschluß. Aus dem salzsauren N-Methyl-p-cyanphenylhydrazin hatte sich das N-Methyl-p-Cyananilin gebildet.


Mikrostickstoffbestimmung:

3,940 mg Sbft. 0,745 ccm N (21°, 737 mm)

C₈H₈N₂ ber. N = 21,21% gef. N = 21,29%

b) Kondensationsversuche.

Zur Darstellung des N-Methyl-p-Cyanphenylhydrazons des Phenacyl-p-toluidins



wurden 1 g salzsaures Hydrazinobenzonitril in der nötigen Menge Äthylalkohol gelöst. Dazu gab ich die berechnete Menge Phenacyl-p-toluidin, gelöst in Chloroform. Nun wurde 12 Stunden lang verschlossen im Dunkeln stehen gelassen. Während dieser Zeit hatte bereits eine Abscheidung von feinen ockergelben Nadelchen stattgefunden. Dieselben wurden von der Reaktionsflüssigkeit abgetrennt und zeigten bei 208° Schmelzen unter deutlichem Rotfärben. Aus Äthylalkohol umkrySTALLISIERT, war der Schmelzpunkt auf 226,5° angestiegen.


1) Lang, Dissertation Erlangen 1927.

Mikrostickstoffbestimmung:

3,360 mg Sbft. 0,466 ccm N (210, 739 mm)
 $C_{23}H_{22}N_4$ ber. N = 15,82% gef. N = 15,65%

Aus der Mutterlauge konnte durch Abdampfen des Chloroforms bei gewöhnlicher Temperatur noch mehr von diesem Körper erhalten werden. Doch war er gegen Schluß der Ausfällung, besonders, als mit Wasserzugabe nachgeholfen wurde, mit viel unverändertem Keton und Hydrazin vermenget. Die Trennung erfolgte aber verhältnismäßig leicht auf Grund der verschiedenen Löslichkeit der Komponenten im Chloroform. Das Hydrazon erwies sich als die stabile Form. Ausbeute 60%.

10. Versuch zur Darstellung des N-Methyl-p-Rhodanphenylhydrazins.



Zur Darstellung des Hydrazins wurde vom Rhodanilin ausgegangen, das aus Anilin, Natriumrhodanid und Brom in Essigsäure dargestellt wurde¹⁾. Die Methylierung erfolgte mittels Dimethylsulfat. Dasselbe wurde in einem kleinen Rundkölbchen auf dem siedenden Wasserbad erhitzt und das Rhodanilin in kleinen Anteilen langsam und unter gutem Schütteln eingetragen. Das methylierte Produkt wurde nicht isoliert, sondern sofort nach Erkalten mit Eiswasser versetzt und unter guter Kühlung nach Zugabe von konzentrierter Salzsäure mit Natriumnitrit nitrosiert. Das Nitrosamin wurde hierauf mittels Zinnchlorür und Salzsäure nach Emil Fischer der Reduktion unterworfen. In der ätherischen Lösung konnte ich, wie schon im theoretischen Teil erwähnt das N-Methyl-p-Rhodanphenylhydrazin auf Grund seiner Reduktionswirkung auf ammoniakalische Silbersalzlösung anfänglich stets deutlich nachweisen. Nach kurzem Stehen ließ aber die Reduktion bereits nach und innerhalb einer halben Stunde war sie gänzlich verloren gegangen. Nach Abdampfen des Äthers

1) Kaufmann, B 59, 187.


blieb jedesmal eine harzige schwarze Masse zurück, die sich nicht mehr weiterverarbeiten ließ.

Weitere Kondensationsversuche mit N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin.

a) m-Nitroacetophenon.

m-Nitroacetophenon wurde durch Nitrieren von Acetophenon mit Salpetersäure neben der o- und p-Verbindung erhalten 1). Derbe schwach gelbgefärbte Prismen $F = 80 - 81^\circ$.

Zur Darstellung des m-Nitroacetophenon-N-Methyl-p-nitrophenylhydrazons



wurden 1 g Methyl-p-nitrophenylhydrazin und 1,2 g m-Nitroacetophenon in Chloroform gelöst und nach Zugabe von 1 Tropfen alkoholischer Salzsäure 2 Tage lang verschlossen stehen gelassen. Während dieser Zeit trat langsam Dunkelrotfärbung ein. Nach Zusatz des gleichen Volumens Äthylalkohol ließ ich das Chloroform durch Schräglegen des Kolbens langsam ablaufen. Es wurden dabei zuerst gelbbraune Nadeln isoliert $F = 150^\circ$, dann fiel ein Gemisch von gelbbraunen Druzen und gelben Nadeln an. Das erste Produkt wurde zwecks Reinigung in warmem Äthylalkohol gelöst. Nach dem Erkalten schieden sich schöne gelbbraune Nadeln ab, die nach wiederholtem Umkristallisieren bei 151° schmolzen. Durch Wasserzusatz konnte aus der alkoholischen Lösung jeweils noch davon gewonnen werden.

Mikrostickstoffbestimmung:

6,502 mg Sbft. 1,028 ccm N (21° , 738 mm)

$C_{15}H_{14}N_4O_4$ ber. N = 17,85% gef. N = 17,8%.

Das Gemisch der zweiten Fraktion wurde ebenfalls mit warmem Äthylalkohol behandelt, wobei sich beim

1) Camps Ar. 240, 1.

langsamem Abkühlen (schöne gelbbraune Nadeln abschied), die mit den oben analysierten übereinstimmten. Aus der alkoholischen Lösung kristallisierte auf Wasserzusatz unverändertes Keton.

Aus der alkoholischen Mutterlauge erhielt ich auf vorsichtigen Wasserzusatz hellgelb gefärbte Nadelchen, die roh bei 70° schmolzen. Durch wiederholtes fraktioniertes Lösen und Kristallisieren, konnte ich so neben dem leichter löslichen Keton ein gelbes Produkt erhalten, das zwischen 138° und 140° schmolz. Nach der Verbrennung zu schließen lag hier unverändertes Hydrazin mit etwas Hydrazon vermischt vor. Da die Menge sehr gering war, sah ich von weiteren Trennungsvorversuchen ab.

Mikrostickstoffbestimmung:

1,648 mg Sbft. 0,354 ccm N (210, 738 mm)

für das Hydrazon berechnet N = 17,83 %

für das Hydrazin berechnet N = 25,15 %


Gefunden N = 24,2 %

Die Ausbeute an stabiler Form betrug 65 %.

b) Desoxybenzoin,

Phenylsigäure wird mit Phosphortrichlorid in das Phenylsigäurechlorid übergeführt und dieses nach der Friedel-Crafts'schen Methode mittels Benzol und Aluminiumchlorid in das Desoxybenzoin verwandelt ¹⁾.

Zur Darstellung des Desoxybenzoin-N-Methyl-p-nitrophenylhydrazons



wurden 1 g Desoxybenzoin in der nötigen Menge Chloroform gelöst und mit einer Chloroformlösung von 1 g N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin vermischt. Als Katalysator wurde der Lösung 1 Tropfen Eisessig beigegeben und hier-

1) Org. Synth. Vol. XII. V. 16.

auf das Gemisch während 24 Stunden sich selbst überlassen. Farbveränderung war während dieser Zeit nicht zu beobachten. Hierauf wurde dem Reaktionsgemisch das gleiche Volumen Alkohol zugefügt und durch Schräglegen des Kolbens das Chloroform langsam entfernt. Nach kurzer Zeit fielen gelbe Nadeln an, die abfiltriert wurden: $F = 159 - 160^\circ$. Durch wiederholtes UmkrySTALLISIEREN aus Alkohol lag schließlich der Schmelzpunkt konstant bei 166° .

Mikrostickstoffbestimmung:


2,829 mg Sbst. 0,300 ccm N (21° , 739 mm)

$C_{21}H_{19}N_3O_2$ ber. N = 12,2 % gef. N = 11,97 %

Aus der Mutterlauge erhielt ich durch vorsichtigen Wasserzusatz ein Gemenge aus Hydrazon, Hydrazin und Keton. Die Trennung des Hydrazons von den Ausgangsmaterialien gelang jedoch infolge seiner Schwerlöslichkeit in Alkohol verhältnismäßig leicht. Die Ausbeute an Hydrazon betrug 50 %.

c) Benzoin.

Um das Benzoin-N-Methyl-p-nitrophenylhydrazon



zu erhalten, wurden 1 g N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin mit der entsprechenden Menge Benzoin in Chloroform gelöst und nach Zugabe von 1 Tropfen Eisessig einen Tag lang verschlossen im Dunkeln stehen gelassen. Die Reaktionsflüssigkeit färbte sich allmählich dunkel. Nach Versetzen mit dem gleichen Volumen Alkohol krySTALLISIERTEN nach kurzem Ablauf des Chloroforms lange farblose Nadeln aus, die sich nach dem Abaugen als Benzoin erwiesen ($F = 134^\circ$). Erst nach weiterem Abdampfen des Chloroforms erhielt ich gelbe Nadelchen, die gegen Schluß noch mit Keton vermenget waren. Durch Behandlung mit Chloroform gelang es schließlich das schwerer lösliche Benzoin-

Methyl-p-nitrophenylhydrazon in Form von safrangelben Nadeln zu erhalten $F = 107^{\circ}$.


Mikrostickstoffbestimmung:

4,932 mgr Sbft. 0,526 ccm N (24° , 739 mm)

$C_{21}H_{19}N_3O_3$ ber. N = 11,65% gef. N = 11,9%.

d) Anilidobenzoin¹⁾.

Die Darstellung des Anilidobenzoin-N-Methyl-p-nitrophenylhydrazons



erfolgte aus 1,5 g Anilidobenzoin und 1 g N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin in Chloroform. Nach Zugabe von 1 Tropfen alkoholischer Salzsäure trat sofort Dunkelfärbung auf, die sich im Laufe der Zeit immer mehr verstärkte. Nach eintägigem Stehen wurde mit Alkohol versetzt. Sofort erschienen lange gelbe Nadeln, die des öfteren aus Alkohol umkrySTALLISIERT, einen Schmelzpunkt bei 166° aufwiesen. Eine angestellte Verbrennung ergab für den Körper einen Stickstoffgehalt von 15,9 %, also um etwa 3% zuviel. Nach weiterem Ablauf des Chloroforms fielen blaßgelb gefärbte Nadeln an, die mit einem braunschwarzen harzigen Produkt verschmiert waren. Durch Lösen in Äthylalkohol und vorsichtiges Ausfällen mit Wasser konnte erreicht werden, daß das Öl in Lösung blieb.

Das so erhaltene Produkt zeigte einen rohen Schmelzpunkt zwischen 110 und 115° , wobei sehr lebhafte Zersetzung auftrat. Durch wiederholtes fraktioniertes Lösen und KrySTALLISIEREN gelang es mir daraus zwei Formen zu erhalten. Aus der erkalteten alkoholischen Lösung krySTALLISIERTEN bei längerem Stehen schön ausgebildete Rauten, die nur schwach gelb gefärbt waren. Durch Wasserzusatz fielen etwas stärker gefärbte Nadeln an. Die schwerer lösliche Form zeigte

1) J. p. Chem. 34, 2.

einen konstanten Schmelzpunkt bei $139,5^{\circ}$, während die leichter lösliche bei 120° schmolz. In beiden Fällen erfolgte bei längerem Erhitzen auf Schmelztemperatur langsame Zersetzung.

Mikrostickstoffbestimmungen:

I. $F=139,5^{\circ}$

5,600 mg Sbft. 0,652 ccm N (28° , 732 mm)

$C_{27}H_{24}N_4O_2$ ber. N = 12,85 % gef. N = 12,72 %

II. $F=120^{\circ}$

4,218 mg Sbft. 0,492 ccm N (28° , 732 mm)

$C_{27}H_{24}N_4O_2$ ber. N = 12,85 % gef. N = 12,74 %.

Die Ausbeute an beiden Formen betrug 55 %.

Aus der Mutterlauge der Kondensationsflüssigkeit erhielt ich bei Wasserzusatze ein schmieriges Produkt zurück, aus welchem ich durch UmkrySTALLISATION aus Äthylalkohol als erste Fällung Hydrazin erhielt. Erst dann fiel ein dunkelrotes Öl an, das das Zersetzungsprodukt des Ketons war. Meine Bemühungen aus den beiden Isomeren ein Racemat aufzubauen versagten. Aus Benzol-Petroläther krySTALLISIERTEN die beiden Formen wieder nebeneinander aus. Ebenso lieferte ein Schmelzdiagramm bei dem Mischungsverhältnis 1:1 kein Maximum, wie das bei der Fähigkeit Racemate zu bilden hätte beobachtet werden müssen.

n-Form (120°)		h-Form ($139,5^{\circ}$)		F
1	:	1	=	$114,5^{\circ}$
3	:	2	=	117°
2	:	3	=	124°
2	:	4	=	$130,5^{\circ}$

Die beiden Hydrazone zersetzten sich, wie schon erwähnt beim Schmelzen, wobei die Entwicklung nitroser Gase festgestellt wurde. Das Zersetzungsprodukt krySTALLISIERTE aus Ätheralkohol in feinen gelbbraunen Nadeln und schmolz bei 100° . Der Stickstoffgehalt betrug 9,7 %.

Mikrostickstoffbestimmung:

1,945 mg Sbft. 0,172 ccm N (25° , 730 mm)

gef. N = 9,73 %.

Molekulargewichtsbestimmung nach Raft:

Substanz: 1,061 mg Borneol: 6,934 mg

Schmelzpunktserniedrigung: 37,6 °.

Molekulargewicht = 114,6.

e) m-Nitrophenacyl-p-toluidin.


Das m-Nitrophenyl-p-toluidin wurde analog dem Phenacyl-p-toluidin aus m-Nitrobromacetophenon ¹⁾ und p-Toluidin dargestellt. F = 150 ° unter Zersetzung.

Mikrostickstoffbestimmung:

3,976 mg Sbft. 0,362 ccm N (25 °, 761 mm)

C₁₅H₁₄N₂O₃ ber. N = 10,37 % gef. N = 10,45 %.

Zur Gewinnung des m-Nitrophenacyl-p-toluidin-Methyl-p-Nitrophenylhydrazons



wurden 1,5 g m-Nitrophenacyl-p-toluidin und 1 g N-Methyl-p-nitrophenylhydrazin in Chloroform gelöst und mit 2 Tropfen einer 10 % igen alkoholischen Salzsäure versetzt. Das Gemisch wurde 24 Stunden im Dunkeln stehen gelassen. Daraufhin wurde mit dem gleichen Volumen Alkohol versetzt. Nachdem ein Teil des Chloroforms abgelaufen war, schieden sich blaßgelbe derbe Nadeln ab, die aus heißem Alkohol öfters umkrySTALLISIERT bei 166 ° schmolzen. Sobald das Chloroform nahezu verdampft war, fiel ein braunes leichtharziges Produkt an: F = 120—130 °. Dasselbe war durch bloßes UmkrySTALLISIEREN nicht zu reinigen. Erst nach dreimaligem Kochen der alkoholischen Lösung mittels Tierkohle erschienen gelbe Nadeln, die ihren Schmelzpunkt bei 148 ° hatten.

Mikrostickstoffbestimmungen:

I. F = 166 °

4,008 mg Sbft. 0,602 ccm N (24 °, 738 mm)

C₂₂H₂₁N₅O₄ ber. N = 16,7 % gef. N = 16,8 %.

1) Evans, Brooks. am. Soc. 30, 306.

II. $F = 148^{\circ}$

3,365 mg Sbft. 0,505 ccm N (24°, 738 mm)
 $C_{22}H_{21}N_5O_4$ ber. N = 16,7 % gef. N = 16,75 %.

Aus Mutterlauge erhielt ich nach Wasserzusatz neben wenig Keton und Hydrazin ein dunkelrotes Öl. Die Ausbeute an Hydrazon betrug 50 %. Die Racemisierungsfähigkeit konnte durch Schmelzversuche als nicht vorhanden festgestellt werden. Ebenso kristallisierten aus Benzol-Petroläther die Komponenten wieder aus.

Vorliegende Arbeit wurde im Institut für angewandte Chemie Erlangen angefertigt.

*Zum Schlusse verbleibt mir die angenehme Aufgabe
 meinem hochverehrten Lehrer*

*Herrn Geheimrat Professor Dr. M. Busch
 auch an dieser Stelle für die Unterstützungen, die er
 mir in jeder Hinsicht bei der Ausführung der Arbeit
 zuteil werden ließ, meinen ergebensten Dank aus-
 zusprechen.*

Lebenslauf.

Ich wurde am 11. Dezember 1909 als Sohn des heutigen Reichsbahnoberinspektors Georg Brecht und seiner Ehefrau Anna, geb. Fischer in Schnabelwaid (Bez.-Amt Pegnitz) geboren. Nach 4jährigem Besuch der Volksschule in Schwabach trat ich im Herbst 1920 in die dortige Realschule ein. Im März 1929 erhielt ich das Reifezeugnis der Oberrealschule Hof/Saale. Nach einjähriger Praktikantenzeit in der Apotheke Ortenburg (Ndb.) bezog ich im Sommer 1930 als Student der Chemie die Universität Erlangen. Hier legte ich im März 1933 das erste, im Oktober 1934 das zweite Verbandsexamen ab. Seit dieser Zeit war ich mit der Anfertigung vorliegender Arbeit beschäftigt. Im Sommersemester 1933 studierte ich in Wien.
